

Instrucciones para después de la operación para la aplicación de Anestesia General

- 1. Favor de **observar a su hijo(a)** durante el día de la cirugía. Es probable que su hijo(a) va querer descansar después de la cirugía. Le recomendamos buscar un lugar cómodo en la cama o en el suelo con una almohada para apoyar a su cuello.
- 2. No permita a su hijo(a) que regrese a la escuela o atender sus actividades después de la cirugía.
- 3. Favor de ayudar a su hijo(a) con caminar hacia el carro y cuando vaya al baño. Por lo general se marean después de la sedación y necesitara ayuda para moverse. Esto es muy importante porque queremos prevenir que su hijo(a) se tropecé o que se caiga.
- 4. Para ayudar a su hijo(a) a recuperar rápidamente es importante que él/ella **tome líquidos** durante el día. Cuando regrese a casa puede empezar a darle pequeñas cantidades de agua o jugo. Usted puede comenzar a darle a su hijo(a) comida, cuando es tolerado (gelatina, sopa, nieve y puré de papas). No anime que coma muy pronto porque puede molestar a su estómago. Si su hijo(a) duerme por más de dos horas, despiértelo(a) y dele líquidos. Coma alimentos blandos mientras sea necesario y vuelva a la dieta normal cuando lo tolere.
- 5. Le puede dar a su hijo(a) **Children's Ibuprofen o Tylenol** cada 4-6 horas si es necesario cuando regrese a casa (si es que el hijo(a) no tiene alergia a esos medicamentos). Esto ayudara a bajar (reducir) el dolor, incomodidad, y posible inflamación después del tratamiento.
- 6. En caso de que a su hijo(a) se le haya aplicado anestesia local (entumecimiento), por favor observar de cerca a su hijo(a) para evitar que se chupe, se pellizque, o muerda sus labios, cachetes o lengua. Lo entumido en general se desparece de 1-2 horas.
- 7. Favor comienza cepillarse la noche de la cirugía. Puede aver sangre, esto es normal. Usted puede usar una toallita mojada en lugar de un cepillo para limpiar los dientes y encías. Esto es importante debido a que si los dientes y las encías están libres de plaque y comida las encías se curan de 10 a 14 días. Dientes y encías limpias previenen de dolor e incomodidad adicional.
- 8. Si a su hijo(a) le pusieron coronas de acero, sus encías tendrán dolor, porque ajustan por debajo de las encías. Notaras unos números negros en las coronas. Se borraran de 2 a 3 días, si están cepillando adecuadamente. Las coronas deben aparecer brillantes cuando están limpios. La corona se caerá con el diente de leche cuando el diente permanente le salga. Su hijo(a) debe **evitar comidas pegajosas** hasta que las coronas se caigan. Por ejemplo, Fruit Roll-ups, Starburst, Milk Duds, y Now & Laters) para evitar que la corona se salga y provocar caries.
- 9. Si su hijo(a) tiene empastes y selladores del color del diente colocado él/ella tiene que evitar comidas y dulces pegajosos porque los empastes puedes salir. Si su hijo(a) tiene coronas del color del diente colocado en los dientes de enfrente, él/ella no puede morder manzanas, zanahorias o elote en la mazorca con los dientes de enfrente. Él/ella tendrá que cortar este tipo de comidas y masticar sus dientes posteriores.



- 10. En caso de a su hijo(a) le hayan sacado algunos dientes es importante evitar que escupa y que use el popote durante 24 horas. Si el área comienza a sangrar de nuevo haga que su hijo(a) muerda una toallita por 15 a 20 minutos y la **presión va parar el sangrado.** Sigue dándole comidas suaves por 2-3 días y mantenga el área limpia para que se cure rápido.
- 11. Su dentista le llamara la noche del tratamiento para ver como esta su hijo(a), pero en caso de que necesites algo antes de la llamada, no dude en llamar a la Dr. Heidi Stark at 402/770-3948, Dr. Libby Johnson at 402/770-7697, Dr. Emily Egley at 402/525-7822, Dr. Katie Garcia at 402/730-0683, Dr. Allie Wolf at 402/660-5484 Dr. Baylee Mink 308/530-5881, Dr. Jen Carter 402/525-9696, or Dr. Alexa Rosenau 402/710-1371.